

Distanzteam Ost Westfalen Lippe

Giftpflanzen Jakobs - Kreuzkraut

Jakobs-Kreuzkraut; Jakobs-Greiskraut

Toxizitätsgrad

Sehr stark giftig +++

Letale Dosis

Pferd

5-20% des Körpergewichts = 0.05-0.20 kg getrocknete Senecio jacobaea/kg Körpergewicht.

Klinische Symptome

Seneziose oder Schweinsberger Krankheit bei **Pferd**



Foto

www.vetpharm.unizh.ch/perldocs/index_x.htm

Pferd: Konditionsverlust, Gewichtsverlust, Anorexie, Kolik, Obstipation oder blutige Diarrhoe, Tenesmus, evt. Rektumprolaps, Hämoglobinurie, häufiges Gähnen, Dyspnoe, Photosensibilität, Ikterus, später wegen Leberversagen hepatoenzephalisches Syndrom mit Unruhe, Taumeln, Ataxie, zielloses Wandern ("Walking Disease"), Zehenschleifen, Lecksucht, Blindheit, Kopfpresen, Depression, Konvulsionen, hepatisches Koma, Tod.

Diagnose

Leberbiopsie, auch für eine prognostische Beurteilung.

Histologie der Leber, Rind und Pferd: Biliäre Hyperplasie, Nekrose der Hepatozyten, extensive Fibrose, Megalozytose, Zirrhose.

Was kann und soll der Besitzer bis zum Eintreffen des Tierarztes unternehmen?

- Weitere Giftaufnahme unterbinden
- Vermeintliche Giftquelle sicherstellen, nicht wegwerfen
- Pferd nicht füttern, Wasser ad libitum (soviel wie möglich)
- Das Pferd sollte in einer gut eingestreuten, weichen Box untergebracht werden, um Verletzungen bei möglichen Koliken oder Krampfanfällen zu vermeiden

Bei Fragen zum Thema bitte an den Tierarzt eures Vertrauens wenden. Ich bin kein TA und kann, will, darf auch keine medizinischen Fragen beantworten.

Hansi Träbert

Quelle: www.vetpharm.unizh.ch/perldocs/index_x.htm